

## ¿Cuándo se retiran los implantes?

En cualquier momento que se desee o al llegar a tres (3) o cinco (5) años, de acuerdo al tipo de implante colocado. El retiro debe ser realizado por personal de salud capacitado.



*Este método **NO** protege del VIH /SIDA ni otras infecciones de transmisión sexual, por lo cual se recomienda el uso del condón.*

## Se debe consultar durante el uso de implantes si:

- 1 Presenta dolor, inflamación, enrojecimiento o picazón en el sitio de inserción.
- 2 Hay expulsión total o parcial de un implante o si se nota que el implante se está saliendo.
- 3 Presenta molestias que atribuya al implante o tenga dudas sobre el método.



Se recomienda asistir a una consulta de seguimiento al segundo o tercer mes de colocado el implante

### Recuerde:



La anticoncepción hace parte del derecho a decidir si se desea o no tener hijos/as.

Marca del implante:

Lote: .....

Fecha: .....

Debe retirarse en la fecha: .....

.....

.....



## Implante subdérmico

*El implante es un método anticonceptivo de larga duración que consiste en una o dos varillas flexibles de plástico, más o menos del tamaño de un fósforo, las cuales contienen una hormona de liberación prolongada. Se coloca debajo de la piel en la parte superior del brazo no dominante.*



## ¿Cómo actúa?

La hormona del implante evita un embarazo principalmente impidiendo que ocurra la ovulación (maduración de ovulo en el ovario, requisito para un embarazo); adicionalmente, espesa el moco cervical dificultando la entrada de los espermatozoides al útero y por consiguiente la capacidad para fecundar un óvulo.

## ¿Cómo se coloca?

Su aplicación es rápida, sencilla y dura unos cuantos minutos.



El/la profesional de salud capacitado aplica anestesia local e inserta el implante por debajo de la piel.

La aplicación no requiere de hospitalización, solo de un vendaje discreto.

La mujer puede realizar con normalidad sus actividades diarias después de la aplicación.

## Beneficios del método

- 1 Es discreto y de larga duración, (de 3 a 5 años dependiendo del tipo de implante).
- 2 El efecto es reversible, es decir, si desea quedar embarazada o si desea dejar de usarlo, se puede extraer en cualquier momento.
- 3 Está recomendado para todas las mujeres.
- 4 Tiene una efectividad del 99%.

## ¿En qué momento se pueden colocar?

Los implantes se colocan cualquier día, siempre que exista la certeza de que no se está embarazada. Es habitual colocarlos en los primeros siete (7) días de la menstruación o inmediatamente después de un parto, cesárea o aborto.

## Tener en cuenta

La zona donde se coloque el implante debe permanecer seca durante dos (2) días, después de este tiempo se retirará la venda.



## Posibles Efectos secundarios

Estos cambios varían entre mujeres, no afectan la salud, mejoran con el tiempo y pueden ser manejados con medicamentos de venta libre según recomendación del/la profesional de salud.

- Durante el primer año de uso la mayoría de las mujeres tienen irregularidades menstruales con sangrados frecuentes y de cantidad variable.
- En ocasiones puede haber ausencia de la menstruación por tiempo prolongado.
- Los implantes no inducen la ganancia o pérdida de peso, no generan acné y no interfieren en el deseo sexual.