

Cero embarazos en la niñez y la adolescencia ¡HOY y SIEMPRE!

Semana Andina de Prevención
de Embarazo 2020

3 Situación del embarazo en la infancia y adolescencia en Colombia

Semana Andina 2020



La salud
es de todos

Minsalud




Fondo de Población
de las Naciones Unidas

Impacto de la Covid-19 en el embarazo en adolescentes

América Latina y el Caribe

La pandemia tendrá un impacto significativo sobre la salud sexual y reproductiva de adolescentes y mujeres en América Latina y el Caribe.

Tendencia de Necesidades Insatisfechas de Anticoncepción y Proyecciones del Impacto por Covid-19, en América Latina y el Caribe 1990-2021



1


- Se estima que la pandemia incremente las necesidades insatisfechas de anticonceptivos en adolescentes y mujeres en la región

Se proyectaba un **11,4%** para 2020-2021

Ahora se proyecta entre **14,5% - 17,7%**

Un retroceso de 20 a 30 años en la meta 3.7 de los ODS
(cero necesidades insatisfechas de anticoncepción en 2030)

- El impacto de la pandemia puede ser mayor para las niñas y adolescentes, que para las mujeres adultas.



Dificultades y barreras en el acceso a los anticonceptivos y servicios de salud sexual y reproductiva



Mayor exposición a situaciones de violencia sexual y abuso en el ámbito intrafamiliar

Podrían aumentar la tasa de embarazo y maternidad adolescente en América Latina y el Caribe, principalmente entre:



Grupos étnicos



Poblaciones rurales



Contextos humanitarios



Menor nivel socioeconómico



Con discapacidad

- Se estima que la Covid-19 puede representar un retroceso en los logros de reducción del embarazo adolescente de América Latina y el Caribe



Aumento en la Tasa Específica de Fecundidad Adolescente de

61 nacidos vivos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años (proyectado para 2020)

a **65** por mil

500 mil embarazos adolescentes adicionales



un **6%** más de lo proyectado para la región, en 2020

- En Colombia, al 5 de septiembre de 2020, se confirmaron:

11 casos de niñas de 10 a 14 años embarazadas



204 casos de adolescentes de 15 a 19 años embarazadas




Que han tenido o tienen Covid-19



Recomendaciones



1 Si bien se observan avances en la reducción del embarazo en la infancia y la adolescencia en los últimos años, es necesario intensificar los esfuerzos para acelerar el logro en la reducción definitiva de este fenómeno, y alcanzar las metas correspondientes en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030¹.



2 La prevención del embarazo en la niñez y adolescencia debe ser parte integral de los Planes de Desarrollo y Planes Territoriales de Salud, así como de los respectivos Planes Indicativos y Planes de Acción, a través de estrategias intersectoriales articuladas con las redes y organizaciones de jóvenes.



3 En Colombia, tener relaciones sexuales con menores de 14 años es considerado un delito (Código Penal Colombiano - Artículos 208 y 209). Sin embargo, la violencia sexual y las uniones tempranas son dos de los principales determinantes del embarazo en la infancia. Es necesario fortalecer las estrategias para eliminar la violencia sexual en niñas y adolescentes, detener las uniones tempranas, transformar las prácticas culturales y marcos legales que las naturalizan.



4 La Educación Integral para la Sexualidad (EIS), dentro y fuera de la escuela, continúa siendo una herramienta protectora contra las violencias basadas en género y los embarazos en la niñez y adolescencia. Es importante fortalecer estas estrategias con un enfoque de equidad y derechos, así como adecuarlas al contexto de la Covid-19.

¹ Metas de los ODS: 3.1. Reducir mortalidad materna, 3.2. Reducir mortalidad neonatal, 3.7. Acceso a servicios de salud sexual - reproductiva y anticoncepción, 3.8. Cobertura universal en salud y acceso a servicios esenciales, 5.2. Eliminar toda violencia contra mujeres y niñas, 5.3. Eliminar MIUT (Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas), 5.6. Acceso a salud sexual - reproductiva (SSR), derechos sexuales y reproductivos (DSDR).



5

Se recomienda desarrollar y adecuar estrategias de empoderamiento de niñas y adolescentes para promover su autonomía y las prácticas protectoras del cuidado de su salud y su cuerpo. Estas acciones deben ser culturalmente apropiadas y adaptadas a sus necesidades, mediante el fortalecimiento de su participación igualitaria en escenarios institucionales, educativos y comunitarios.



6

La pandemia incrementó las necesidades de servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes, así como el riesgo de violencia sexual en niñas y adolescentes al interior de los hogares. Es necesario adecuar y visibilizar las rutas de atención para el acceso a estos servicios, incluyendo a anticonceptivos modernos.



7

Es importante implementar medidas alternativas para brindar información a adolescentes y jóvenes sobre sus derechos sexuales - reproductivos, y cómo acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva en el contexto de la Covid-19.



8

Las medidas para prevenir y mitigar el impacto de la Covid-19 en la fecundidad, durante la infancia y la adolescencia, deben contar con la participación de adolescentes y jóvenes. Esta población constituye un aliado fundamental para la mitigación de riesgos y la difusión de información en las comunidades durante las crisis.



9

Se deben aumentar los esfuerzos para establecer medidas de prevención de riesgos relacionados con el uso de la Internet por parte de niños, niñas y adolescentes, con el fin de proteger su salud y su vida.